

PRECIZARI

In acest pliant sunt prezentate, extrem de sumar, doar o mica parte din bolile care pot sa apara la curci.

Informatii detaliate se pot obtine consultand literatura de specialitate sau apeland „telefonul clientului” unde va putem ajuta cu consultanta gratuita in acest scop.

Aceasta sinteza - realizata in asa fel incat sa incapa intr-un pliant – este doar o parte din intentia noastra de a ajuta micul crescator sa previna pierderile prin mortalitate care pot sa apara chiar si in conditiile unei furajari adecvate a curcilor.

Existenta bolilor in localitate este suficienta pentru a pune in pericol sanatatea si viata pasarilor din gospodaria dumneavoastra.

De aceea, inainte de orice tratament, este absolut necesara luarea masurilor de biosecuritate veterinara, care insemna:

- Cresterea izolata a pasarilor asa incat sa se evite contactul cu pasarile din alte gospodarii;
- Dezinfectia riguroasa dinaintea oricarei serii de crestere;
- Asigurarea medicatiei preventive, conform indicatiilor de pe pliantele distribuite in magazinele VITAL.

De asemenea recomandam crescatorilor, indiferent de efectivul de pasari, sa pastreze o legatura permanenta cu medical veterinar din localitate, care este singurul in masura sa cunoasca situatia bolilor din zona si care poate sa intervina eficient in prevenirea si tratarea bolilor la curci.

NU UITATI !!!

ESTE INTOTDEAUNA MAI IEFTIN SA PREVII DECAT SA COMBATI O BOALA !!!

Echipa VITAL

NU UITATI !

Starea de sanatate a curcilor este data in cea mai mare masura de calitatea furajului pe care il consuma.

Va asiguram ca la magazinele VITAL aveti parte de **CELE MAI PERFORMANTE FURAJE PENTRU CURCI CARE SE VAND IN MAGAZINELE DIN ROMANIA.**

Sunt produse intr-o fabrica moderna din Ungaria sub licenta belgiana si sunt distribuite doar prin magazinele VITAL.

CATEGORII DE PUI comercializati prin magazinele VITAL

1. Pui de gaina
 - pentru carne ROSS 308
 - pentru oua ISA BROWN
 - mixt carne-oua MASTER GREY etc
2. Pui de curca
 - pentru carne BIG 6
3. Boboci de rata
 - pentru carne Pekin
4. Alte categorii la comenzi speciale
 - boboci de gasca
 - pui de bibilici
 - prepelite

Informatii suplimentare gasiti in magazinele VITAL.

VITAL BEST NUTRITION Sediul central:
Timisoara, Bd. Dambovita, Nr. 100
Tel : 0356.175.220 www.furaje-vital.ro

MAGAZINE VITAL IN ZONA DUMNEAVOASTRA:



CELE MAI INTALNITE 7 BOLI ALE CURCILOR



telefonul clientului

BOALA	DESCRIEREA BOLII	SIMPTOME SI LEZIUNI	PREVENIRE SI COMBATERE
PSEUDOPESTA	Boala infectioasa respiratorie, virala, foarte contagioasa. Afecteaza curcile incepand cu varsta de 3 saptamani si poate duce la mortalitate 30%-100% din efectiv.	Simptome: -penaj infoiat, - respiratie zgomotoasa, -diaree galbena-verzui - uneori vertij (ameteii) Leziuni: -puncte hemoragice pe mucoasa respiratorie si a stomacului glandular	Prevenire: -dezinfectia prealabila a spatiului; - cresterea izolata a curcilor si evitarea contactului cu pasarile vecinilor; - vaccinare specifica de catre medicul veterinar. Tratament: -nu exista tratament specific.
GUTURAIUL	Boala infectioasa produsa de un virus care slabeste imunitatea organismului si afecteaza caile respiratorii superioare unde, pe acest fond, se suprapun infectii secundare. Mortalitatea poate ajunge la 50% din efectiv.	Simptome: -umflarea bilateral a sinusurilor si deformarea capului; -respiratie zgomotoasa si scurgeri de mucozitati limpezi Leziuni: -In organelle interne - necaracteristic	Prevenire: -conditii corespunzatoare de crestere si furajare; Tratament: -antibiotice impotriva bacteriilor secundare (ex: amoxicilina, lincospectin, tilozina)
LEUCOZA	Boala infectioasa virotica ce apare pe fondul unor deficiente in conditiile de crestere si de hranire.	Simptome: -necaracteristice, uneori tulburari de mers sau paralizii; Leziuni: -splina si ficatul sunt marite si cu aspect palid.	Prevenire: -asigurarea conditiilor optime de crestere si furajare; Tratament: -nu exista
VARIOLA	Boala infectioasa virotica, cu raspandire rapida, apare in a doua jumatate a verii, mortalitate redusa.	Simptome: -eruptii cutanate pe piele, creasta si barbite Leziuni: -Nu exista. Leziuni apar doar in cazul interventiei unor bacterii de asociatie.	Prevenire: -dezinfectia prealabila a spatiului de cazare; -evitarea contactului cu pasarile vecinilor; -exista vaccin dar se utilizeaza rar in sistemul gospodaresc (se apeleaza la medicul veterinar) Tratament: -local – Albastru de metilen sau Tinctura de Iod. -general: polivitamine in apa de baut
MICOPLASMOZA	Boala infectioasa bacteriana, cu raspandire rapida, mai ales la curcile peste 3-4 luni.	Simptome: -respiratie zgomotoasa si inflamatii ale sinusurilor care deformeaza capul (ca si in cazul Guturaiului); -tulburari de mers, umflarea articulatiilor si deformari ale picioarelor. Leziuni: -necaracteristic, eventual intarirea plamanilor si lichid in articulatii.	Prevenire: -dezinfectie prealabila a spatiului de cazare; -achizitionarea de pui din surse cu garantie a sanatatii puilor; Tratament: -Antibiotice active fata de Mycoplasma dar si fata de bacterii de asociatie: Tylozina, Lincospectin, Eritromicine. -Polivitamine
COLIINFECTIA	Se mai numeste si „boala de mizerie” pentru ca apare pe fondul unor conditii de intretinere deficitare: paie umede, aglomeratie, temperature scazut sau prea crescuta etc.	Simptome: -mortalitate ridicata; - pasarile sunt abatute, cu penele zburlite; -diaree, de obicei albicioasa Leziuni: -organele interne, in principal inima, plamanii si ficatul sunt acoperite de fibrin (pelicula albicioasa)	Prevenire: -dezinfectie prealabila a spatiului de cazare; -asigurarea conditiilor de confort si furajare. Tratament: -Antibiotice active la E. Coli (ex. Amoxicilina)
BOALA CAPULUI NEGRU	Boala parazitara cu raspandire rapida si cu mortalitate ridicata.	Simptome: -sornolenta, pene zburlite -diaree de culoare galben-sulf -la curcile peste 3-4 luni, pielea capului capata o culoare albastrui inchis Leziuni: -ficatul prezinta pete necrotice, de culoare galben-cenusie -depozite fibrinoase in apendicele intestinale (cecuri)	Prevenire: -dezinfectia spatiului de cazare -evitarea contactului cu pasarile vecinilor Tratament: -Metronidazol, Furazolidon (ex. Produsul Enteroguard – la varsta de peste 4 saptamani) -Enteroguard-ul se poate administra si preventiv, in reprise de cate 2 zile, la interval de 10-14 zile. -polivitamine in apa de baut